

## KAVUN KIZILBÖCEĞİ

(*Rhaphidopalpa foveicollis*)



Kavun kızılböceği ergini

### Tanımı ve Yaşayışı:

- Erginleri 6.5-7 mm boyunda olup vücut şekli uzunca ve silindirikdir. Oldukça hareketli bir böcektir.
- Larva limon sarısı renginde ve ince uzun olup, olgunlaştığında 10-15 mm boya ulaşır.
- Kavun kızılböceği, kışı ergin döneminde diyapoz durumunda kuru yapraklar altında veya toprak içinde geçirir.
- Erginler ilkbaharda havaların ısınmasıyla kavun tarlalarında görülmeye başlarlar.
- Yılda 2-4 döl verir.

### Zarar Şekli:

- Kavun kızılböceği'nin hem ergini ve hem de larvası zararlıdır.
- Erginleri genç bitkilerin yaprak, sürgün ve çiçekleri üzerinde beslenirler ve yaprakları kalbur gibi delik deşik ederler.
- Larvaların zararı ise köklerde dir. Bitkilerin ana ve yan köklerini delerek tahrip ederler.

### Zararlı Olduğu Bitkiler:

- Kabakgiller bu zararlının konukçusudur. Özellikle kavun ve hıyarı tercih ederler. Karpuz ve kabak ikinci derecede tercih ettiği konukçulardır.

### Mücadele yöntemleri:

Kültürel önlemler:

- Tarlada sonbahar veya erken ilkbaharda derin sürüm yapılması kışı geçirmek üzere bitki artıkları veya toprakta bulunan erginlerin yok edilmesi bakımından oldukça yararlıdır.

### Kimyasal mücadele:

- Kullanılacak ilaçlar ve dozları hakkında en yakın il veya ilçe müdürlüklerine başvurulmalıdır.